

Η σύγχρονη χειρουργική ανοίγει πραγματικά τους ορίζοντες στην αντιμετώπιση όλων σχεδόν των παθήσεων του δέρματος. Ο ασθενής θεραπεύεται χωρίς να μένουν σημάδια και ουλές και χωρίς να αισθάνεται πόνο.

Μιχαήλ Ν. Βοργιάς M.D., F.A.C.S

Διευθυντής Χειρουργός
Γενικής - Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Mediterraneo Hospital

Μέλος European Association
for Endoscopic Surgery E.A.E.S.
Μέλος Society of American Gastrointestinal
Endoscopic Surgeons S.A.G.E.S.

Ιατρείο
Σωκράτους 47, Αιξωνή
166 74 Γλυφάδα
τηλ.: 210 8982771
κιν.: 6977 407508
michael@vorias.gr
www.vorias.gr

Mediterraneo Hospital
Ηλείας 8-12
166 75 Γλυφάδα
τηλ.: 210 9117000

Παθήσεις του Δέρματος, Θεραπεία Κονδυλωμάτων



Μιχαήλ Ν. Βοργιάς M.D., F.A.C.S

Παθήσεις του Δέρματος

Η σύγχρονη χειρουργική με τις νέες μεθόδους που εφαρμόζει, σχεδόν χωρίς τομές αλλά με χρήση της τεχνολογίας Laser και RF, προσφέρει πλήρη ίαση χωρίς σημάδια, ουλές και πόνο στις παρακάτω παθήσεις του δέρματος:

- ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ
- ΛΙΠΩΜΑΤΑ
- ΣΠΙΛΟΙ
- ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ
- ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΣ
- ΔΥΣΜΟΡΦΕΣ ΟΥΛΕΣ

Η αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων του δέρματος δεν απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο, γίνεται με τοπική αναισθησία, ανώδυνα, χωρίς ράμματα με φυσική συνέπεια ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, οι βλάβες που αφαιρούνται στέλνονται για ιστολογική εξέταση.



Σμηγματογόνος κύστη



Δύσμορφες ουλές



Λίπωμα ράχης



Ευρυαγγείες



Σπίλος

Θεραπεία Κονδυλωμάτων

Τα οξυτενή κονδυλώματα, όπως είναι η τυπική τους ονομασία, μεταβιβάζονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή αλλά και με άμεση δερματική επαφή. Οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Human Papillomaviruses (HPV).

Κατά την εμφάνισή τους παίρνουν διάφορες μορφές, μπορεί να μοιάζουν σαν ελιές του δέρματος, να σχηματίζουν πλάκες, να είναι διαφανή, κόκκινα ή έντονα καφέ. Δεν προκαλούν ιδιαίτερα ενοχλήματα παρά μία αίσθηση φαγούρας ή ελαφρού καψίματος.




Στη γυναίκα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του αιδοίου, του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού καθώς και στις μηρογεννητικές πτυχές.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής τους στον τράχηλο, έχουν ενοχοποιηθεί για καρκινωμάτωσης εξεργασίες.

Στους άντρες αντίστοιχα, στην περιοχή του πέους, στους όρχεις, στις μηρογεννητικές πτυχές και στην περιοχή του πρωκτού.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής τους στην περιοχή του πρωκτού, έχουν ενοχοποιηθεί για ανάπτυξη καρκινώματος του πρωκτού.

Αποτελεσματική, ανώδυνη και με άριστα αισθητικά αποτελέσματα θεραπεία έχουμε με την εφαρμογή του υπερπαλμικού LASER CO2.



Έχει ιδιαίτερη σημασία η επισκόπηση από ειδικό ιατρό (χειρουργό) της περιοχής ενδοπρωκτικά για τον εντοπισμό κονδυλωμάτων στην περιοχή, ώστε να αφαιρεθούν κι αυτά, προκειμένου να μην αποτελούν εστία συνεχούς τροφοδότησης και υποτροπών της νόσου.

Το 1-2% των κονδυλωμάτων μπορεί να προκληθεί από τον ιό των κοινών μυρμηκιών.

Η θεραπεία τους είναι ιδιαίτερα επιτυχής με την χρήση CO2 LASER με τοπική αναισθησία. Χρειάζεται επανεξέταση κάθε μήνα για την εξάλειψη πιθανών υπολειμματικών βλαβών, καθώς και βλαβών που ήδη "επώάζονταν".

Επειδή ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 1-8 μήνες, κριτήριο ίασεως είναι η πλήρης ανυπαρξία βλαβών επί 8 μήνες.